

Distalis humerus törés műtétjét követő késői szeptikus folyamat kezelése

Dr. Szabó Zsaklin, Dr. Szabó Lehel

Hungary, Szolnok, Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet



79 éves nőbeteg humerus supracondyler törésének műtéti ellátását követően szeptikus folyamat indult a fenti területen. Feltárást, necrectomiát, fémeltávolítást végeztünk, majd a kb 2,5 tenyérynyi kialakult bőrhiány Vivano negatív nyomású kezelését indítottuk M-es mérettel, illetve a nemesképleteket fehér szivaccsal fedve. Kezdetben állandó szívást alkalmaztunk, a váladék csökkenésekor intermittáló szívásra váltottunk. A kötőscseréket 4-5 naponta végeztük. 3 héttel később a sebalap feltisztult, sarjszövettel feltelődött, így félvastag bőrplasztikát végeztünk, a donor bőr megtapadását szintén Vivanoval megtámogatva 5 napon keresztül. 2 hónapon belül gyógyult.

1.kép: Szivacskezelés megkezdése előtti státusz

2.kép: NPWT kivitelezése

3.kép: Második kötőscserék már jól látható a seb feltelődése sarjszövettel 10.nap

4.kép: Közvetlenül a plasztika előtti sebstátusz 20.nap

5.kép: Félvastag bőrplasztika

6-7.kép: A beteg gyógyult 51.nap